

14 W ilu ulach rodzin, które przeżyły obecne były ślady silnej biegunki (znaczne ilości kału)?

15 W sezonie 2018 transportowałam/em przynajmniej raz rodziny na pożyczki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania

a) tak

b) nie

c) nie wiem

16 Średnio, jaki procent plastrów wymienił/a Pan/i w rodzinie w 2018 r.?

a) 0%

b) 1-30%

c) 31-50%

d) więcej niż 50%

17 Czy wymienione pożyczki w 2018 r. były wykorzystywane przez większość pana/i rodzin?

sady

a) tak

b) nie

c) nie wiem

rzepak

a) tak

b) nie

c) nie wiem

kukurydza

a) tak

b) nie

c) nie wiem

wrzos

a) tak

b) nie

c) nie wiem

nawłóć

a) tak

b) nie

c) nie wiem

spadź

a) tak

b) nie

c) nie wiem

18 Czy w okresie kwiecień 2018 - kwiecień 2019 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach pszczelich?

a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

19 Czy w okresie kwiecień 2018 - kwiecień 2019 zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

a) tak

b) nie

c) nie wiem/nie dotyczy

20 Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2018 - kwiecień 2019) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą i wskazać kiedy rozpoczął/ęła konkretny zabieg przeciwwarrozowy w rodzinach produkcyjnych	Miesiąc, w którym dane zabiegi lecznicze rozpoczęto:												
	2018								2019				
Metoda/Produkt	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień
Badanie stopnia porażenia przez <i>Varroa destructor</i>													
Wycinanie czerw trutowego													
Hipertermia (stosowanie wysokiej temperatury)													
Inna metoda biotechniczna (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerw, izolowanie matki)													
Kwas mrówkowy – krótkoterminowo (do 3 dni)													
Kwas mrówkowy – długoterminowo													
Kwas szczawiowy - nakrapianie													
Kwas szczawiowy – sublimacja (odparowanie)													
Beevital Hive Clean/Bienenwohl/VarroMed													
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)													
Flumetryna (np. Bayvarol)													
Amitraz w paskach (Biowar)													
Ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?													
Amitraz – tabletki do odymiania (Apiwarol)													
Ile razy i w jakich odstępach przeprowadzano odymianie?													
Inny produkt chemiczny (.....)													
Inna metoda (.....)													

21 W większości swoich rodzin stosuję:

a) osiatkowane dennice zimą

a) tak

b) nie

c) nie wiem

b) ocieplane ule

a) tak

b) nie

c) nie wiem

c) plastikowe ule

a) tak

b) nie

c) nie wiem

d) certyfikowane pszczelarstwo organiczne

a) tak

b) nie

c) nie wiem

e) linie pszczół „odporne” na Varroa

a) tak

b) nie

c) nie wiem

f) plastry o małych komórkach (5,1 mm lub mniej)

a) tak

b) nie

c) nie wiem

g) naturalne plastry (bez węzy)

a) tak

b) nie

c) nie wiem

h) nabywanie wosku/węzy spoza pasieki

a) tak

b) nie

c) nie wiem

22 Jeżeli w pasiece w sezonie 2018 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie się przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

Nie wiem



Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
SGGW